

schülke -†



Antiseptique pour la peau prêt à l'emploi pour l'application préopératoire ainsi qu'avant les prélèvements de sang et les injections.

kodan® Teinture forte

Notre plus :

- large spectre d'efficacité antiseptique
- efficacité rapide (15 sec. avant les injections)
- bonne adhérence aux feuilles d'incision après séchage
- très bien toléré par la peau
- listé VAH/DGHM

Domaines d'application

- Pour l'antisepsie cutanée avant les interventions chirurgicales, les injections et les prélèvements de sang, les ponctions ainsi qu'avant les excisions, les poses de canule et les biopsies
- Pour le soin des plaies et des sutures
- Pour la désinfection hygiénique des mains (seulement kodan® Teinture forte incolore)
- Pour accompagner les mesures d'hygiène générales dans le cadre de la prévention des dermatomycoses

Méthodes et indications d'application

Antisepsie cutanée avant des injections, des ponctions, des excisions, etc. :

Vaporiser kodan® Teinture forte sur la zone cutanée concernée ou la frotter avec un tampon imbibé de cette préparation et respecter le temps d'action. Lors de l'utilisation de kodan® Teinture forte avant les tests de glucose (p. ex. sticks hémogluco), bien laisser sécher la préparation afin d'éviter une éventuelle altération.

Avant des ponctions articulaires et une antisepsie cutanée préopératoire :

- Raser la zone cutanée concernée, si nécessaire.
- Baigner ou laver le patient ou la zone cutanée concernée (p. ex. avec les lotions lavantes esemtan® ou octenisan®) si possible une heure avant l'antisepsie cutanée. Appliquer kodan® Teinture forte à l'aide d'un tampon ou en la vaporisant.
- Si l'on utilise des feuilles d'incision, on veillera à un séchage suffisant de kodan® Teinture forte avant de coller la feuille afin de ne pas altérer l'adhérence.
- N'appliquer un thermocautère que lorsque les parties cutanées traitées avec kodan® Teinture forte seront sèches.

Soin des plaies et des sutures

Pour le soin des plaies et des sutures, kodan® Teinture forte peut être soit appliqué avec un tampon stérile, soit vaporisé directement. On veillera à ce que les quantités résiduelles de la préparation puissent s'écouler ou soient tamponnées. Les sutures opératoires seront, de préférence, tamponnées à l'aide d'un tampon imbibé.

Désinfection hygiénique des mains

Lors de la désinfection hygiénique des mains, ces dernières devraient rester bien humectées pendant tout le temps d'action.

Efficacité microbiologique

- Bactéricide, y compris les mycobactéries (Tb) • fongicide • virucide à effet limité* (y c. les virus VHB, VIH, VHC et herpès simplex) • virucide contre le rotavirus et l'adénovirus

kodan® Teinture forte

Temps d'action

Domaine d'application/Germes	Recommandation pour l'application / Temps d'action
Peau pauvre en glandes sébacées (selon certificat VAH/DGHM) : - avant les injections et les prélèvements de sang : - avant les ponctions articulaires : - pour les antisepsies cutanées pré- et post-opératoires :	15 sec. 60 sec. 60 sec.
Application répétée avant les interventions sur une peau riche en glandes sébacées dans les régions du crâne et du front :	10 min.
Désinfection hygiénique des mains (selon certificat VAH-/ DGHM)	3 ml de kodan® Teinture forte incolore, non diluée – 30 sec.
SARM	30 sec.
Virus : virucide à effet limité* (y c. les virus VHB, VIH, VHC, herpès simplex) : Rotavirus Adénovirus	30 sec. 30 sec. 10 min.

Spécifications

Composition :

100 g de solution contiennent :
composants à efficacité médicinale : 45,0 g de 2-Propanol,
10,0 g de 1-Propanol, 0,20 g de 2-biphénol

Autres composants :

solution de peroxyde d'hydrogène à 30% (Ph. Eur), eau purifiée
kodan® Teinture forte colorée contient en plus les colorants
E 104, E 110, E 151.

Données physicochimiques

coloré

Aspect : brun
Densité : 0,896 ± 0,003 g/cm³
Viscosité à 20 °C : temps d'écoulement de < 15 s selon DIN 53 211

incolore

Aspect : incolore
Densité : 0,896 ± 0,003 g/cm³
Viscosité à 20 °C : temps d'écoulement de < 15 s selon DIN 53 211
Thermostabilité : stable entre -5 °C et +40 °C
Point d'inflammation : 24 °C (selon DIN 51 755)

Remarques spéciales

kodan® Teinture forte étant employé à l'état non dilué, on veillera à humecter complètement les zones cutanées à traiter.

Réservé à l'usage externe. Conserver la préparation hors de portée des enfants. Inflammable. Ne pas mettre en contact avec des flammes nues ou des sources de chaleur électriques enclenchées.

Conditionnement / Unités d'emballage

Conditionnement	Unités d'emballage	Référence
kodan® Teinture forte incolore Flacon de 250 ml Flacon de 250 ml Pompe vaporisatrice Flacon de 1 l Flacon de 2 l	10 x 250 ml 10 x 1 l 5 x 2 l	104 022 104 020 104 014 104 015
kodan® Teinture forte colorée Flacon de 1 l	10 x 1 l	104 805

Information écologique

schülke fabrique ses produits selon des processus modernes, sûrs et respectueux de l'environnement, de manière économique et en respectant des normes de qualité sévères.

Expertises et informations

Sur le site Internet www.schuelke.com, vous trouverez un aperçu de toutes les expertises/toute la littérature existant sur la préparation kodan® Teinture forte.

Pour vos questions individuelles :
Customer Care

Tél. : +41 44 466 55 44

E-mail : mail.ch@schuelke.com

kodan® Teinture forte • Comp. : Alcohol isopropyllicus 403 mg, Alcohol propyllicus 90 mg, 2-Phenylphenol 1,8 mg, Exc. ad solut. pro 1 ml. colorée : color. : E 104, E 110, E 151 **Ind :** désinfection de la peau avant une intervention opératoire ou diagnostique, cathétérisme, prélèvement de sang ou de LCR, injection, ponction, excision pose de canule, biopsie. Désinfection de plaies et soins en cas de suture. kodan® Teinture forte incolore convient à la désinfection hygiénique des mains. **Mode d'emploi :** Appliquer ou vaporiser jusqu'à recouvrement complet de la région cutanée, de la plaie ou de la suture à désinfecter. Durée d'action : 1 minute en cas d'injection et de prélèvement de sang, désinfection de la peau avant et après une opération, soins des plaies et des sutures. Contre le virus de l'hépatite B, une durée d'action de 5 minutes est nécessaire, et il faut veiller à ce que la zone à désinfecter reste humide pendant cette durée. Pour la désinfection hygiénique des mains, frotter env. 3 ml de kodan® Teinture forte incolore pendant 30 secondes. **CI :** ne pas utiliser au niveau des muqueuses, des yeux ou des oreilles! Hypersensibilité **EI :** kodan® Teinture forte peut entraîner une légère sensation de brûlure en cas d'application topique et une allergie de contact dans de rares cas. kodan® Teinture forte colorée : à cause de la présence de colorants azoïques, une réaction d'hypersensibilité cutanée et du système respiratoire peut apparaître, en particulier chez les patients atteints d'asthme, d'urticaire chronique ou d'hypersensibilité aux antirhumatismaux non stéroïdiens. **Catégorie de remise D** L'information professionnelle complète est publiée dans le Compendium Suisse des Médicaments. • **Conseil sur les produits / l'application** Schülke & Mayr GmbH, 22840 Norderstedt • **Titulaire d'admission :** Schülke & Mayr AG, 8003 Zurich



Schülke & Mayr GmbH est certifiée selon DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001 et DIN EN ISO 13485 (n° de reg. 004567-MP23) et dispose d'un système de gestion environnementale validé selon l'ordonnance sur l'éco-audit (n° de reg. D-150-00003).

Schülke & Mayr GmbH
22840 Norderstedt, Allemagne
Tél. +49 (0) 40 - 521 00 - 0
Fax +49 (0) 40 - 521 00 - 318
www.schuelke.com
mail@schuelke.com

Schülke & Mayr AG
Sihlfeldstrasse 58
8003 Zurich, Suisse
Tél. +41 (0) 44 - 466 55 44
Fax +41 (0) 44 - 466 55 33
mail.ch@schuelke.com

Schülke France SARL
94250 Gentilly, France
Tél. +33 (0) 1 - 49 69 83 78
Fax +33 (0) 1 - 49 69 83 85
smfrance.info@airliquide.com